ISBN: 978-602-98559-2-0

PROSIDING SEMINAR

Bidang Matematika dan Informatika

SEMINAR DAN RAPAT TAHUNAN
BIDANG ILMU MIPA 2013

BKS PTN BARAT

Universitas Lampung, 10-12 Mei 2013









FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG

Universitas Lampung, 10-12 Mei 2013

Didukung oleh:















PT. Vanadia Utama

PROSIDING

SEMINAR DAN RAPAT TAHUNAN

Bidang MIPA BKS PTN Wilayah Barat Tahun 2013 Bandar Lampung, 10 – 12 Mei 2013

ISBN 978-602-98559-2-0

Dewan Penyunting

Warsito Sutopo Hadi Tati Suhartati Simon Sembiring Mulyono Muslim Ansori Mustofa Usman Kurnia Muludi **Endang Linirin W** Sumardi Buhani Suripto Dwi Yuwono Jani Master Sugeng Sutiarso Abdurrahman Nismah Nukmal

Penyunting Pelaksana

Heri Satria Kamisah D Pandiangan Elly Lestari Febriandi Hasibuan Rifgi Almusawi R



Diterbitkan oleh FMIPA Universitas lampung
Bandar Lampung
Penyunting: Warsito dkk.
ISBN 978-602-98559-2-0
Cetakan Pertama, Tahun 2013
©copyright FMIPA Unila

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI	Halaman i ii
PEMBENTUKAN RING FAKTOR PADA RING DERET PANGKAT TERITLAK MIRING Ahmad Faisol	1-5
PENGARUH PENDEKATAN RME DAN KEMANDIRIAN BELAJAR TERHADAP KEMAMAMPUAN MATEMATIS SISWA Ahmad Fauzan dan Yerizon	7-14
ESTIMASI TINGKAT KEMATIAN BAYI DAN HARAPAN HIDUP BAYI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005 DENGAN MENGGUNAKAN METODE TRUSSEL Ahmad Iqbal Baqi	15-20
PENGOLAHAN CITRA DIJITAL PENYAKIT TANAMAN PADI MENGGUNAKAN METODE MAKSIMUM ENTROPY Aidil fitriansyah	21-24
TAKSIRAN PARAMETER DISTRIBUSI WEIBULL DENGAN MENGGUNAKAN METODE MOMEN DAN METODE MAKSIMUM LIKELIHOOD Arisman Adnan, Eka Meri Kristin, Sigit Sugiarto	25-28
PENERAPAN ALGORITMA GENETIKA PADA PERINGKASAN TEKS DOKUMEN BAHASA INDONESIA Aristoteles	29-34
GRAF LOBSTER BERBILANGAN KROMATIK LOKASI EMPAT Asmiati	35-38
PENGGUNAAN METODE ARIMA UNTUK MERAMALKAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA YANG DATANG KE SUMATERA UTARA MELALUI FASILITAS BANDARA INTERNASIONAL POLONIA MEDAN Atus Amadi Putra, Arija Ardial	39-46
METODE FINITEDIFFERENCE INTERVAL UNTUK MENYELESAIKAN PERSAMAAN PANAS Aziskhan, Mardhika W.A, Syamsudhuha INVESTIGASI NILAI BARISAN INTEGRAL DARI PELL DAN PELL-	47-54
LUCAS POLINOMIAL	55-60
Baki Swita MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA SISWA KELAS XSMA ADIGUNA BANDAR LAMPUNG MELALUI MODELPEMBELAJARAN INVESTIGASI KELOMPOK Buang Saryantono	61-68

PENDUGA DATA HILANG PADA RANCANGAN BUJUR	
SANGKAR LATIN DASAR	275-282
Idhia Sriliana	
KETAKBIASAN DALAM MODEL CFA (CONFIRMATORY FACTOR	
ANALYSIS) PADA METODE ESTIMASI DWLS (DIAGONALLY	293-290
WEIGHTED LEAST SQUARES) UNTUK DATA ORDINAL	230 230
Indah Permata Sari, Eri Setiawan, Nusyirwan	
PENGHITUNGAN SUBSET VISIBILITAS PADA SUATU	
ORTHOGONAL POLYHEDRON	291-296
Jefri Marzal	
MOMEN AKUMULASI DARI SUATU ANUITAS AWAL DENGAN	
TINGKAT BUNGA EFEKTIF	297-300
Johannes Kho dan Ari Fatmawati	
IDENTIFIKASI DAN KUMULASI PILIHAN JAWABAN	
RESPONDEN PADA KERTAS LEMBAR JAWABAN	301-306
MENGGUNAKAN METODA TEMPLATE MATCHING	301 300
Joko Risanto dan Zaiful Bahri	
APLIKASI METODE RECURSIVE LEAST SQUARE	
(RLS)NDALAM MEMODELKAN ESTIMASI PEMAKAIAN	007.040
LISTRIK DENGAN BANTUAN PAKET PROGRAM R	307-312
(STUDI KASUS : PELANGGAN PLN KOTA BENGKULU)	
Jose Rizal, Pepi Novianti	
HUBUNGAN KEKONGRUENAN DALAM GEOMETRI TERHINGGA	313-318
Lina Ardila Sari, Suharsono, Muslim Ansori	
MODEL MATEMATIKA ALIRAN FLUIDA LAPISAN BATAS	319-322
TERHADAP TERHADAP PELAT MENDATAR	319-322
Leli Deswita, Syamsudhuha & Endang Lili IMPLEMENTASI PRAKTEK INOVASI PEMBELAJARAN	
MATEMATIKA (PIPM) DALAM MPMBS SMP, SMA DAN SMK DI MAHASISWA ANGKATAN 1 PROGRAM S2 PENDIDIKAN	323-332
THE HILL ROLL THE COLUMN TO TH	323-332
MATEMATIKA JPMIPA FKIP UNIB TAHUN 2012	
Drs. M. Fachruddin. S M.Pd	
PENGELOMPOKAN BANK DI INDONESIA BERDASARKAN	
VARIABEL KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS	333-338
FAKTOR DAN ANALISIS GEROMBOL BERHIRARKI	
Maiyastri, Izzati Rahmi, Vina Fakhri Malayudi dan Budi Rudianto KARAKTERISTIK PENDUGAAN EMPERICAL BEST LINEAR	
UNBIASED PREDICTION (EBLUP) PADA PENDUGAAN AREA	339-344
KECIL	
M. Adi Sidauruk, Dian Kurniasari, Widiarti	
PARADOKS PADA PERSOALAN TRANSPORTASI	345-348
M. D. H. Gamal, T. P. Nababan dan Endang Lily	
KAJIAN METODE LINDSTEDT-POINCARE DAN VAN DER POL	
PADA SOLUSI MASALAH OSILASI NON LINEAR	349-352
Media Rosha	
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MATEMATIKA BERBASIS	
MASALAH UNTUK MEMFASILITASI PENCAPAIAN	353-360
KEMAMPUAN PENALARAN DAN PEMAHAMAN KONSEP SISWA	
Prof. Dr. Mukhtar, M.Pd.	

Penduga Data Hilang Pada Rancangan Bujur Sangkar Latin Dasar

Idhia Sriliana

Jurusan Matematika FMIPA UNIB E-mail: atha muflih@yahoo.co.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari prosedur pendugaan data hilang pada Rancangan Bujur Sangkar Latin Dasar. Pada Rancangan Bujur Sangkar Latin Dasar, tiap data yang hilang dapat merusak keseimbangan rancangan, sehingga perlu dilakukan pendugaan data hilang untuk mengatasi masalah inferensia mengenai perlakuan. Metode pendugaan data hilang yang digunakan yaitu Metode Yates. Metode yang dikemukakan oleh Yates (1933) digunakan untuk analisis percobaan pada beberapa data hilang dengan menyisipkan nilai dugaan yang meminimumkan jumlah kuadrat galat percobaan. Analisis percobaan pada berbagai kondisi data hilang dengan menerapkan suatu contoh kasus menunjukkan hasil yang sama dengan analisis jika data pengamatannya tidak hilang. Dari hasil kajian disimpulkan bahwa prosedur pendugaan data hilang dengan meminimumkan jumlah kuadrat galat percobaan dapat digunakan untuk analisis percobaan data hilang pada Rancangan Bujur Sangkar Latin Dasar.

Kata Kunci. Data Hilang, Metode Yates, Rancangan Bujur Sangkar Latin Dasar.

PENDAHULUAN

Terkadang dalam pelaksanaan percobaan di lapangan satu atau lebih pengamatan hilang dari gugus data. Hal ini mungkin dapat terjadi, misalnya bila seekor binatang yang digunakan dalam percobaan mati sebelum percobaan selesai, satu plot hanyut karena kebanjiran atau rusak karena terserang hama, satu perlakuan yang salah diterapkan dalam satuan percobaan yang bukan semestinya, sebuah tabung percobaan pecah jatuh ke lantai, dan berbagai alasan lainnya [1].

Pada Rancangan Bujur Sangkar Latin Dasar tiap nilai yang hilang merusak keseimbangan rancangan, karena beberapa kontras perlakuan akan terkontaminasi dengan pengaruh blok. Sehingga perlu diambil langkah-langkah untuk meminimumkan pengaruh data hilang, khususnya dalam inferensia mengenai perlakuan.

Rancangan Bujur Sangkar Latin Dasar merupakan suatu rancangan lapangan yang mengelompokan satuan percobaan

berdasarkan dua kriteria pengelompokan, misalnya baris dan lajur. Pada rancangan ini, semua perlakuan ditempatkan secara acak ke dalam satuan percobaan dimana tiap perlakuan harus muncul dalam jumlah yang sama pada tiap baris dan lajur [2]. data pada rancangan mensyaratkan rancangan yang ortogonal dimana tiap perlakuan harus ada dalam setiap baris dan lajur. Jika terjadi data hilang maka analisis data tidak dapat dilakukan sehingga informasi diperlukan tidak diperoleh.

Model linier pada Rancangan Bujur Sangkar Latin Dasar didefinisikan sebagai

$$Y_{ij} = \mu + \rho_i + \gamma_j + \sum_{k=1}^{t} \tau_{(k)} + \varepsilon_{ij} \quad i, j, k = 1, ..., t$$
 (1)

dimana

 Y_{ij} = pengamatan pada baris ke-i dan lajur ke-j

 μ = rataan umum

 $\rho_{\rm i}$ = pengaruh baris ke-*i*

 γ_i = pengaruh lajur ke-j

 $\tau_{(k)} \ = \ \begin{cases} \tau_k \ , \, \text{perlakuan ke-}k \, \, \text{pada posisi} \, (i,j) \\ 0 \ , \, \text{perlakuan ke-}k \, \, \text{tidak pada posisi} \, (i,j) \end{cases}$

 ε_{ii} = galat percobaan

dengan asumsi untuk model tetap yang digunakan dalam rancangan yaitu:

$$\sum_{i=1}^{t} \rho_i = \sum_{i=1}^{t} \gamma_j = \sum_{k=1}^{t} \tau_{(k)} = 0 \quad \text{dan} \quad \varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma_{\varepsilon}^2)$$

Suatu metode yang bisa digunakan untuk analisis percobaan pada data hilang Metode Yates. Metode adalah dengan menyisipkan dilakukan nilai dugaan yang meminimumkan jumlah kuadrat galat percobaan. Nilai dugaan yang didapat tidak memberikan informasi tambahan untuk percobaan, tetapi hanya fasilitas untuk analisis data sebagai sisanya. Metode Yates dapat digeneralisasikan untuk menduga dua data hilang. Data hilang yang pertama ditaksir dengan menghitung rata-rata dari nilai yang diketahui pada baris, lajur dan perlakuan yang memuat salah satu dari data yang hilang. Selanjutnya, data hilang yang lain ditaksir dengan menggunakan Metode Yates. Penaksiran dengan Metode Yates terus dilakukan berulang-ulang untuk kedua data hilang secara bergantian hingga konvergensi tercapai. [4].

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dalam penelitian ini akan dilakukan pengkajian Metode Yates sebagai prosedur pendugaan data hilang pada Rancangan Bujur Sangkar Latin Dasar.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yates yang merupakan suatu metode untuk analisis data hilang pada rancangan percobaan dengan cara menyisipkan nilai dugaan yang meminimumkan jumlah kuadrat galat percobaan.

Untuk satu nilai tunggal yang hilang dalamRancangan Bujur Sangkar Latin Dasar, maka nilai dugaan data hilang tersebut dapat diperoleh sebagai berikut: Jika data yang hilang adalah $Y_{gh(u)}$ yaitu nilai pengamatan pada baris ke-g, lajur keh, dan perlakuan ke-u, maka nilai dugaan M adalah [3]

$$M = \frac{t(R_g + C_h + T_u) - 2G}{(t - 1)(t - 2)}$$
 (2)

dimana:

= banyaknya baris, lajur, dan perlakuan yang digunakan

 $R_g = total$ semua pengamatan yang tak hilang pada baris ke - g

 C_h = total semua pengamatan yang tak hilang pada lajur ke -h

 $T_u = total$ semua pengamatan yang tak hilang pada perlakuan ke – u

G = total semua pengamatan yang tak hilang

Prosedur pendugaan satu data hilang dengan metode Yates adalah

1. Sisipkan sembarang nilai, misalnya M, untuk data yang hilang

2. Tentukan nilai *M* yang meminimumkan Jumlah Kuadrat Galat Percobaan, yaitu dengan menggunakan persamaan (2).

3. Sisipkan nilai dugaan tersebut, dan hitung semua jumlah kuadrat yang digunakan dalam analisis varian.

4. Hitung analisis varian gugus data dengan masing-masing derajat bebas total dan galat percobaan dikurangi satu dan jumlah kuadrat perlakuan dikurangi faktor koreksi bias.

Apabila terdapat dua data hilang dalam Rancangan Bujur Sangkar Latin Dasar, yaitu $Y_{kl(m)}$ (nilai pengamatan pada baris ke-k, lajur ke-l, dan perlakuan ke-m) dan $Y_{gh(u)}$ (nilai pengamatan pada baris ke-g, lajur ke-h,dan perlakuan ke-u), dengan penduga berturut-turut adalah A dan B. Maka salah satu data hilang (misalkan diaproksimasi dengan menggunakan rumus [4]:

$$A_0 = \frac{(\overline{Y}_{k.} + \overline{Y}_{l} + \overline{Y}_{(m)})}{3}$$
 (3)

dimana:

 A_0 = nilai dugaan awal

= rata – rata pengamatan yang tak hilang pada baris ke – k

= rata – rata pengamatan yang tak hilang pada lajur ke -l

 $\overline{Y}_{(m)}$ = rata – rata pengamatan yang tak hilang pada perlakuan ke-m



Kemudian hitung nilai dugaan A dan Bhingga konvergensi tercapai, dengan menggunakan persamaan (3)dimana total pengamatan yang tak hilang ditambahkan nilai dugaan awal.

Prosedur pendugaan dua data hilang dalam rancangan Bujur Sangkar Latin Dasar adalah

- 1. Hitung nilai dugaan awal dari salah satu data hilang dengan menggunakan persamaan (3).
- 2. Masukkan nilai dugaan awal yang diperoleh pada langkah 1 ke dalam tabel nilai pengamatan dan hitung nilai dugaan satu data hilang yang tersisa dengan menggunakan persamaan (2).
- 3. Lakukan perhitungan seperti pada langkah 2 untuk menduga dua data hilang tersebut secara bergantian, hingga konvergensi tercapai.
- 4. Sisipkan nilai dugaan dua data hilang yang konvergen (didapat pada langkah 3) dan hitung semua jumlah kuadrat yang digunakan dalam analisis varian
- 5. Hitung analisis varian gugus data dengan masing-masing derajat bebas total dan galat percobaan dikurangi 2 (banyaknya data yang hilang) dan jumlah kuadrat perlakuan dikurangi faktor koreksi bias.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Satu Data Hilang

Jika terdapat satu data hilang dalam Rancangan Bujur Sangkar Latin Dasar, maka pendugaan data hilang dilakukan langsung dengan Metode Yates. Metode Yates yang dirumuskan pada persamaan (2)diturunkan melalui cara berikut:

Berdasarkan model linier Rancangan Sangkar Latin Dasar pada persamaan (1) dapat dituliskan

$$Y_{..} = \sum_{i=1}^{t} \sum_{j=1}^{t} Y_{ij}$$
 (4)

$$Y_{i.} = \sum_{j=1}^{t} Y_{ij}$$
 (5)

$$Y_{.j} = \sum_{i=1}^{t} Y_{ij} \tag{6}$$

$$Y_{(k)} = \sum_{i=1}^{t} \sum_{i=1}^{t} Y_{ij} \lambda_{k}$$
 (7)

dimana

Y = total nilai dari seluruh satuan percobaan

 Y_{i} = total nilai dari satuan percobaan pada baris ke-i Y_{j} = total nilai dari satuan percobaan pada lajur ke-j $Y_{(k)}$ = total nilai pengamatan perlakuan ke (k) yang berada pada posisi (i, j)

Andaikan M adalah sebuah data yang hilang pada baris ke-g, lajur ke-h, dan perlakuan ke-u maka dapat dimisalkan

$$Y_{g.} = \sum_{i \neq h} Y_{gj} + Y_{gh} = R_g + M$$
 (8)

$$Y_{.h} = \sum_{i \neq g} Y_{ih} + Y_{gh} == T_h + M$$
 (9)

$$Y_{(u)} = \sum_{i \neq p} \sum_{i \neq h} Y_{ij} \lambda_{(u)} + Y_{gh} = T_u + M$$
 (10)

$$Y_{..} = \sum_{i \neq g} \sum_{j \neq h} Y_{ij} + Y_{gh} = G + M$$
 (11)

M adalah penduga data yang hilang, sedemikian rupa meminimumkan Jumlah Kuadrat Galat Percobaan, selanjutnya

$$\begin{aligned} \text{JKG} &= \sum_{i=1}^{t} \sum_{j=1}^{t} Y_{ij}^{2} - \frac{1}{t} \sum_{i=1}^{t} Y_{i.}^{2} - \frac{1}{t} \sum_{i=1}^{t} \sum_{j=1}^{t} \left(Y_{ij} \lambda_{(k)} \right)^{2} \\ &- \frac{1}{t} \sum_{j=1}^{t} Y_{.j}^{2} + \frac{2}{t^{2}} \left(\sum_{i=1}^{t} \sum_{j=1}^{t} Y_{ij} \right)^{2} \\ &= \left(\sum_{i \neq g} \sum_{j \neq h}^{t} Y_{ij}^{2} + M^{2} \right) - \frac{1}{t} \left(\sum_{i \neq g} Y_{i.}^{2} + (R_{g} + M)^{2} \right) \\ &- \frac{1}{t} \left(\sum_{i \neq g} \sum_{j \neq h}^{t} \left(Y_{ij} \lambda_{(k)} \right)^{2} + (T_{u} + M)^{2} \right) \\ &- \frac{1}{t} \left(\sum_{j \neq h}^{t} Y_{.j}^{2} + (C_{h} + M)^{2} \right) + \frac{2}{t^{2}} (G + M)^{2} \end{aligned}$$

$$\frac{\partial (JKG)}{\partial M} = 2M - \frac{2}{t} \left(R_g + M \right) - \frac{2}{t} \left(T_u + M \right) - \frac{2}{t} \left(C_h + M \right) + \frac{4}{t^2} \left(G + M \right) \tag{12}$$

dengan menyamakan hasil turunan pertama JK(Galat) terhadap *M*pada





persamaan (12)sama dengan nol, maka diperoleh:

$$2M - \frac{2}{t}(R_g + M) - \frac{2}{t}(T_u + M) - \frac{2}{t}(C_h + M) + \frac{4}{t^2}(G + M) = 0$$

$$\Leftrightarrow M - \frac{1}{t}(R_g + M) - \frac{1}{t}(T_u + M) - \frac{1}{t}(C_h + M) + \frac{2}{t^2}(G + M) = 0$$

$$\Leftrightarrow M \left(1 - \frac{1}{t} - \frac{1}{t} - \frac{1}{t} + \frac{2}{t^2}\right) = \frac{1}{t}R_g + \frac{1}{t}T_u + \frac{1}{t}C_h - \frac{2}{t^2}.G$$

$$\Leftrightarrow M \left(\frac{t^2 - 3t + 2}{t^2}\right) = \frac{t \cdot R_g + t \cdot C_h + t \cdot T_u - 2G}{t^2}$$

$$\Leftrightarrow M((t - 1)(t - 2)) = t(R_g + C_h + T_u) - 2G$$

$$\Leftrightarrow M = \frac{t(R_g + C_h + T_u) - 2G}{(t - 1)(t - 2)}$$

terbukti bahwa M merupakan rumus Metode Yates seperti pada persamaan (2).

Pengaruh Terhadap Analisis Varian Tabel 8Analisis Varian Untuk Satu Data Hilano

Tillang			
Sumber	db	JK	KT
Baris	t-1	JK[B]	
Lajur	t-1	JK[L]	KT[P]
Perlakuan	t-1	JK[P.Terkoreksi]	KT[G]
Galat	(t-1)(t-2)-1	JK[G]	
Total	$(t^2-1)-1$	JK[T]	

Nilai dugaan data hilang yang disisipkan ke dalam gugus data akan berpengaruh terhadap analisis Derajat bebas dari Total dan Galat percobaaan masing-masing berkurang satu. Selain itu, Jumlah Kuadrat Perlakuan berbias ke atas, artinya memberikan Jumlah Kuadrat Perlakuan yang lebih tinggi dari seharusnya. Tapi, melalui perhitungan sederhana diperoleh Jumlah Kuadrat Perlakuan Terkoreksi. Sehingga analisis varian untuk satu data hilang dalam Rancangan Bujur Sangkar Latin Dasar dapat dilihat pada Tabel 1.

Faktor Koreksi Bias dapat dihitung dengan menggunakan rumus [4]:

$$Bias = \frac{\left[G - R_g - C_h - (t - 1)T_u\right]^2}{\left[(t - 1)(t - 2)\right]^2}$$
(13)

M = nilai dugaan data hilang

t = banyaknya perlakuan yang digunakan

 R_o = total semua pengamatan yang tak hilang

pada baris ke – g C_h = total semua pengamatan yang tak hilang pada lajur ke -h

 $T_u =$ total semua pengamatan yang tak hilang pada perlakuan ke-u

Untuk pengujian dengan taraf uji α , $H_0: \mu_1 = \mu_2 = ... = \mu_t$ lawan H_1 : sedikitnya ada $\mu_i \neq \mu_j$ untuk $i \neq j$ (1, 2, ..., t)

 $H_0: \sigma_{\tau}^2 = 0$ lawan $H_0: \sigma_{\tau}^2 > 0$ digunakan statistik uji:

$$F_{hit} = \frac{KT[Perlakuan\, Terkoreksi]}{KT[Galat\, Percobaan]} \sim F_{\alpha;(t-1),(t-1)(t-2)-1}$$

Teladan Analisis untuk Satu Data Hilang

Diberikan teladan penerapan untuk analisis satu data hilang dalam Rancangan Bujur Sangkar Latin Dasar menggunakan permasalahan berikut [5]

Suatu percobaan telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh pencampuran bensin terhadap penghematan bahan bakar diukur melalui yang jarak tempuh (km/liter).

Karena keterbatasan mobil yang ada, diputuskan menggunakan Rancangan Bujur Sangkar Latin Dasar dengan memperpanjang waktu percobaan. Terdapat lima jenis mobil yang berbeda yaitu: I, II, III, IV dan V. Perlakuannya sebanyak 5 macam, yaitu:

A: kontrol (bensin tanpa pencampuran)

B: kontrol + bahan X produksi perusahaan I

C: kontrol + bahan Y produksi perusahaan II

D: kontrol + bahan U produksi perusahaan I

E: kontrol + bahan V produksi perusahaan II

Misalkan bahwa setelah melakukan pengacakan baris dan lajur sesuai dengan dilakukan

prosedurnya dan setelah percobaan diperoleh hasil berikut

dimana

Tabel 9Data Penggunaan Bahan Bakar (km/liter)

Tabel ADala Feligg	Tabel 9Data Feligguliaan Bahai (kiii/illel)								
Hari			Merk Mobil			Total Baris			
(Waktu)	I	II	III	IV	V	Total Daris			
1	B = 14	A = 10	E = 11	C =12	D = 10	57			
2	C = 10	D = 10	B = 11	A = 8	E = 12	51			
3	E = 14	B = 12	C = 13	D = 11	A = 9	59			

4	A = 11	C = 11	D = 10	E = 10	B = 13	55
5	D = 13	E = 12	A = 9	B = 10	C = 13	57
Total Lajur	62	55	54	51	57	279

Tabel 10 Analisis data pada Tabel 2

Sumber	db	JK	KT	F_{hitung}
Baris [Hari]	4	7.36		
Lajur [Mobil]	4	13.36		
Perlakuan	4	23.76	5.9	4.22^{*}
[Bensin]				
Galat	12	16.88	1.41	
Total	24	61.36		

 $F_{0.05:4.12} = 3.26$

Berdasarkan analisis varian, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat cukup bukti pada taraf kepercayaan 5% untuk menyatakan bahwa perlakuan pencampuran bensin mempengaruhi respon penggunaan bahan bakar.Misalkan dari **TABEL 4**, data perlakuan dalam baris ke-2 dan lajur IV dianggap hilang, sehingga tabel pengamatan menjadi:

Tabel 11Data Penggunaan Bahan Bakar, dengan Satu Data Hilan

Baris	Lajur				Jumlah	Jumlah	
Daris	I	II	III	IV	V	Baris	Perlakuan
1	14	10	11	12	10	57	39
2	10	10	11	M	12	43	60
3	14	12	13	11	9	59	59
4	11	11	10	10	13	55	54
5	13	12	9	10	13	57	59
Jumlah Lajur	62	55	54	43	57		
Jumlah Pengamatan						271	

Berdasarkan Tabel 4diketahui:
$$t = 5$$
, $R_g = 43$, $C_h = 43$, $T_u = 39$, $G = 271$

Dengan menggunakan persamaan (2) diperoleh nilai dugaan untuk data yang hilang, yaitu

$$M = \frac{5 \times (43 + 43 + 39) - (2 \times 271)}{(5 - 1)(5 - 2)}$$

= 6.92

Selanjutnya dengan mengganti data hilang terhadap nilai dugaannya, lakukan analisis data seperti biasa yaitu dengan analisis varian untuk gugus data yang ditambahkan. Analisis varian yang diperoleh disajikan pada Tabel 5, dengan faktor koreksi untuk Bias sebesar:

Bias =
$$\frac{\left[271 - 43 - 43 - ((5 - 1) \times 39)\right]^2}{\left[(5 - 1)(5 - 2)\right]^2} = 5.84$$

JK[Perlakuan Terkoreksi] = 27.76-5.84 = 21.92 Tabel 12Analisis Varian untuk Data Tabel 4

Tabel 13Hasil Analisis untuk Satu Data Hilang

Data Hilang	Nilai Dugaan	F_{hitung}
Perlakuan C pada Baris	M = 12	4.06*

-	Sumber	db	JK	KT	F_{hitung}	F_{tabel} $(\alpha = 0.05)$
					- nuung	,
]	Baris	4	9.63			
]	Lajur	4	15.63			
]	Perlakuan	4	21.92	5.48	3.69*	3.36
(Galat	11	16.32	1.48		
_	Total	23	69.33			

Untuk taraf nyata uji sebesar 5% $(\alpha = 0.05)$, $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak. Hal ini berarti cukup bukti pada taraf kepercayaan 5% untuk mengatakan bahwa perlakuan pencampuran bensin mempengaruhi respons penggunaan bahan bakar. Melalui prosedur yang sama, maka untuk contoh lain satu data hilang dalam baris, lajur, dan perlakuan yang tidak sama diperoleh hasil berikut:

ke-4 dan lajur ke-II		
Perlakuan E pada Baris	M = 13.33	3.72^{*}
ke-3 dan lajur ke-I		

 $F_{0.05;4,11} = 3.36$



Berdasarkan teladan yang diberikan, pada prosedur pendugaan satu data hilang dalam Rancangan Bujur Sangkar Latin Dasar diperoleh hasil analisis yang sama dengan analisis jika data pengamatannya tidak hilang. Hasil analisis menunjukkan kesimpulan yang sama yaitu signifikan pada taraf uji 5%, artinya perlakuan yang diberikan berpengaruh nyata terhadap percobaan.

Dua Data Hilang

Jika terdapat dua data hilang dalam Rancangan Bujur Sangkar Latin Dasar, maka pendugaan data hilang masih dapat dilakukan dengan Metode Yates, tetapi salah satu data yang hilang terlebih dahulu diaproksimasi dengan menggunakan persamaan (3). Kemudian, dengan menggunakan nilai dugaan awal, dilakukan pendugaan data dengan metode Yates secara bergantian atau dilakukan proses iterasi hingga konvergensi tercapai.

Pengaruh Terhadap Analisis Varian

Sama halnya seperti pada datahilang, nilai dugaan untuk dua data hilang

berpengaruh terhadap analisis varian. Derajat bebas dari Total dan Galat percobaaan masing-masing berkurang duadan Jumlah Kuadrat Perlakuan berbias

ke atas dengan faktor koreksi bias dapat dihitung dengan menggunakan rumus [4]

Bias =
$$\frac{\left[G - R_k - C_l - (t - 1)T_m\right]^2 + \left[G - R_g - C_h - (t - 1)T_u\right]^2}{\left[(t - 1)(t - 2)\right]^2}$$
(14)

Sehingga analisis varian untuk dua data hilang dapat dilihat pada tabel berikut Tabel 14Analisis Varian untuk Dua Data Hilang

Sumber	Db	JK	KT
Baris	<i>t</i> -1	JK[B]	
Lajur	<i>t</i> -1	JK[L]	KT[P]
Perlakuan	<i>t</i> -1	JK[P.Terkoreksi]	KT[F]
Galat	(t-1)(t-2)-2	JK[G]	KI[U]
Total	$(t^2-1)-2$	JK[T]	

Untuk pengujian dengan taraf uji α , $H_0: \mu_1 = \mu_2 = ... = \mu_t$ lawan H_1 : sedikitnya ada $\mu_i \neq \mu_i$ untuk $i \neq j$ (1,2,...,t)

 $H_0: \sigma_{\tau}^2 = 0$ lawan $H_0: \sigma_{\tau}^2 > 0$ digunakan statistik uji:

$$F_{hit} = \frac{KT[Perlakuan\, Terkoreksi]}{KT[Galat\, Percobaan]} \sim F_{\alpha;(t-1),(t-1)(t-2)-2}$$

Teladan Analisis untuk Dua Data Hilang

Misalkan dari Tabel 2data perlakuan A dalam baris ke-4, lajur ke-I dan data perlakuan C dalam baris ke-3 lajur ke-III dianggap hilang. Sehingga tabel pengamatan menjadi.

Tabel 15 Pengamatan dengan Dua Data Hilang

Baris	Lajur					Jumlah	Jumlah
	I	II	III	IV	V	Baris	Perlakuan
1	14	10	11	12	10	57	36
2	10	10	11	8	12	51	60
3	14	12	\boldsymbol{C}	11	9	46	46
4	\boldsymbol{A}	11	10	10	13	44	54
5	13	12	9	10	13	57	59
Jumlah Lajur	51	55	41	51	57		
Jumlah Pengamatan						255	

Berdasarkan Tabel 4 diketahui:

$$t = 5, R_k = 44, C_l = 51, T_m = 36, R_g = 46, C_h = 41, T_u = 46, G = 255$$

Untuk melakukan analisis terhadap dua data hilang tersebut maka dilakukan prosedur pendugaan sebagai berikut:

Misalkan nilai dugaan awal yang dihitung untuk data hilang adalah perlakuan A, maka dengan menggunakan persamaan (3) diperoleh nilai dugaan awal

$$A_0 = \frac{(11+12.8+9)}{3} = 10.92$$



Kemudian dengan mensubtitusikan nilai dugaan awal pada total pengamatan yang tak hilang, hitung nilai dugaan dan Cmelalui proses iterasi hingga konvergensi tercapai, dengan menggunakan persamaan (4).

Tabel 16Nilai Dugaan Hasil Proses Iterasi

Iterasi	Nilai D	Nilai Dugaan				
	В	A				
Pertama	11.10	10.23				
Kedua	11.21	10.21				
Ketiga	11.21	10.21				

Dari proses iterasi, diperoleh nilai dugaan A=10.21 dan C=11.21. Selanjutnya dengan mengganti dua data yang hilang terhadap nilai dugaannya, lakukan analisis varian untuk gugus data yang diduga. Analisis varian yang diperoleh disajikan pada Tabel 10. Tabel 17Analisis Varian untuk Data Tabel 8

Sumber	db	JK	KT	F_{hitung}	F_{tabel} $(\alpha = 0.05)$
Baris	4	5.82			
Lajur	4	13.19			
Perlakuan	4	21.18	5.3	3.57^{*}	3.48
Galat	10	14.83	1.48		
Total	22	58.58			

dengan faktor koreksi untuk Bias sebesar:

Bias =
$$\frac{\left[255 - 44 - 51 - (5 - 1)36\right]^2 + \left[255 - 46 - 41 - (5 - 1)46\right]^2}{\left[(5 - 1)(5 - 2)\right]^2} = 3.56$$

Hasil analisis menunjukkan kesimpulan yang sama yaitu signifikan pada taraf uji 5%, artinya perlakuan yang diberikan berpengaruh nyata terhadap percobaan.

KESIMPULAN

Prosedur pendugaan data hilang dengan Metode Yates dapat digunakan untuk analisis percobaan data hilang dalam Rancangan Bujur Sangkar Latin Dasar. Pendugaan data vang hilang mengakibatkan Jumlah Kuadrat Perlakuan berbias ke atas dan derajat bebas dari Total dan Galat Percobaan masing-masing berkurang sesuai dengan jumlah data yang hilang. Berdasarkan teladan penerapan, hasil analisis sampai pada dua data hilang dalam Rancangan Bujur Sangkar Latin Dasar masih memberikan kesimpulan yang sama dengan analisis jika data pengamatannya tidak hilang.

DAFTAR PUSTAKA

Sudjana. (1989). *Desain dan Analisis Eksperimen*. edisi ketiga. Tarsito. Bandung.

- R. L. Ott and M. Longnecker. (2001). Statistical Methods and Data Analysis. 5th edition. Duxbury. USA.
- M. Lentner and T. Bishop. (1986).
 Experimental Design and Analysis.
 Valley Book Company. Blacksburg, VA, USA.
- R. G. D. Stell and J. H. Torrie. (1981).
 Principles and Procedures of Statisics.
 2nd edition. McGraw-Hill International Book Company. Singapore.
- V. Gaspersz. (1991). *Metode Perancangan Percobaan*. ARMICO. Bandung.





Sertifikat BADAN KERJASAMA

PERGURUAN TINGGI NEGERI WILAYAH BARAT (BKS-B)
BIDANG ILMU MIPA

diberikan kepada:



Idhia Sriliana, S.Si, M.Si

sebagai: Pemakalah

Pada kegiatan:

SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT TAHUNAN BIDANG ILMU MIPA

Tema:"Peran Ilmu MIPA dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Menunjang Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia".

Di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung, 10-12 Mei 2013

BKS PTM Barat Koordinator Bidang MIPA,

Ketua Panitia



Prof. Sutopo Hadi, M.Sc., Ph.D NIP. 197104151995121001

Dr. Sutarman, M.Sc NIP.196310261991031001











