

TeknosiA



Jurnal Ilmiah Bidang Sains - Teknologi
Murni Disiplin dan Antar Disiplin

ISSN No. : 1978 - 8819

Vol. 1, No. 9, Tahun V, Maret 2011

- | | |
|---|----|
| ■ Analisis Struktur Shell Akibat Beban Temperatur (Studi Kasus Kiln Indarung V PT. Semen Padang) | 1 |
| <i>Oleh Dedi Suryadi, Adi Yussanto, Staf Pengajar Teknik Mesin UNIB</i> | |
| ■ Analisis Perubahan Tata Guna Lahan Terhadap Kualitas Air Dengan Program Linier (Studi Kasus : Pada Beberapa Sungai Besar di Provinsi Bengkulu, Indonesia) | 15 |
| <i>Oleh Gusta Gunawan, Staf Pengajar Teknik Sipil UNIB</i> | |
| ■ Using Bee Colony Optimization To A Financial Time Series Prediction | 23 |
| <i>Oleh Ernawati, Staf Pengajar Teknik Informatika UNIB</i> | |
| ■ Implementasi Dekoder Viterbi Pada Kode Konvolusi (2,1,2) Berbasis FPGA | 31 |
| <i>Oleh Reza Satria Rinaldi, Staf Pengajar Teknik Elektro</i> | |
| ■ Analisa Perhitungan Efisiensi Turbin Uap Tipe Back Pressure Turbine Pada Kondisi Beban Puncak (Studi Kasus di PT. Agra Sawitindo) | 41 |
| <i>Oleh Angki Puspawan, Staf Pengajar Teknik Mesin</i> | |
| ■ Analisis Pendangkalan Alur Pelayaran Akibat Sedimentasi Di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu | 53 |
| <i>Oleh Muhammad Fauzi, Staf Pengajar Teknik Sipil UNIB</i> | |
| ■ Studi Efek Harmonisa Pada Lampu Hemat Energi (LHE Ber SNI dan LHE tanpa SNI) | 61 |
| <i>Oleh Irnanda Priyadi, Yenni Suhartini, Staf Pengajar Teknik Elektro UNIB</i> | |
| ■ Watak Harmonik Pada Inverter Berbeban | 69 |
| <i>Oleh Rika Favoria Gusa, Ika Novia Anggraini Staf Pengajar Teknik Elektro Universitas Bangka Belitung, Teknik Elektro UNIB</i> | |

TeknosiA



ISSN : 1978 - 8819

Vol. I, No. 9, Tahun V, Maret 2011

Jurnal TeknosiA mempublikasikan karya tulis di bidang Sain – Teknologi, Murni Disiplin dan Antar Disiplin, berupa penelitian dasar, perancangan dan studi pengembangan teknologi. Jurnal terbit berkala enam bulanan (Maret dan September).

Pelindung

Dr. Ir. Muhammad Syaiful, M.S

Penyunting Ahli (Mitra Bestari)

DR. Eddy Hermansyah, (UNIB)

Dr. Ir. Febrin Anas Ismail, M.Eng (UNAND)

Prof. Mulyadi Bur, Dr-Ing. (UNAND)

Dr Ir. Refdinal Nafsir (UNAND)

Redaktur

Anizar Indriani, ST., MT.

Redaktur Pelaksana

Elhusna, ST.MT

Dewan Redaksi

Drs. Boko Susilo., M.Kom.
Ade Sri Wahyuni, ST. M.Eng

Irnanda Priyadi, ST., MT.
Nurul Iman Supardi, ST., MP.

Penerbit

FAKULTAS TEKNIK – UNIVERSITAS BENGKULU

Sekretariat Redaksi

Gedung V Fakultas Teknik – Universitas Bengkulu, Jalan Raya Kandang Limun
Bengkulu 38123 Telp. : (0376) 21170, 344067 Fax. : (0376) 22105 E-mail:
teknosia@yahoo.com

**ANALISIS PERUBAHAN TATA GUNA LAHAN TERHADAP
KUALITAS AIR DENGAN DENGAN PROGRAM LINIER**
(Studi Kasus : Pada Beberapa Sungai Besar di Provinsi Bengkulu, Indonesia)

Gusta Gunawan

Staf Dosen Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik, Konsentrasi Pengembangan Sumber Daya Air, Universitas Bengkulu, gustagunawan@yahoo.com

ABSTRACT

Bengkulu Province is one of the provinces that most of its land is still forest. Changes in land use in some watersheds, the forests into plantations has affected surface water quality in some major rivers. Based on the results of monitoring conducted by the Environment Agency and Bengkulu provinces compared with the PP No. 82 year 2001, some physical and chemical properties of the raw water has been classified in class two and three and even some that have been included in the fourth grade. If attempts to use the forest into plantations continues to do so will continue to surface water quality has decreased from year to year. This study aimed to determine the relationship between the decrease of forest area with increasing concentrations of TDS. This research was conducted at several major rivers in the province of Bengkulu. Approach to the calculation of changes in land use with changes in water quality is done by classifying the land into several groups, namely forest land, dry land, wetlands and land developed. Data processing was done using multiple regression equations and the calculation process carried out with the aid of computer program SPSS for Windows version 15. The independent variable was forest land, dry land, wetlands and land woke up and the dependent variable is the TDS. To determine the relationship of forest area in a watershed with an increased concentration of TDS, the rank regression analysis. Based on the results of significance test (Test f) jointly obtained the result that the change of forest land, dry, wet and woke up a significant influence on increasing the concentration of TDS. Based on the results of tests of significance (t test) partially forest land use changes, wet and dry have a significant effect on increasing the concentration of TDS. Forest area with the concentration equation is obtained $TDS = 0.275 + 0.1114 \cdot 0.7513 \cdot Das\ Area$. The conclusion is the relationship with the TDS concentration is a forest area of non-linear equation negative ranking. Each reduction of one unit of forest area will cause an increase in TDS concentration of one unit.

Keywords: Changes in land use, surface water quality, concentrations of TDS and the forest are

1. PENDAHULUAN

Kualitas air beberapa sungai besar di Provinsi Bengkulu dalam dasawarsa terakhir ini mengalami penurunan dari kelas satu menjadi kelas dua dan tiga. Bahkan ada beberapa dari parameter fisika dan kimia yang diukur telah masuk kepada kelas empat (Bapedalda Provinsi Bengkulu, 2007). Hal tersebut diduga sebagai akibat perubahan tata guna lahan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) terutama beralih fungsinya lahan hutan dibagian hulu menjadi lahan perkebunan. Pertumbuhan jumlah penduduk dan ekonomi menyebabkan pemanfaatan hutan dan sumber daya yang ada

dikawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari (Suripin, 1998).

Pengaruh perubahan tata guna lahan suatu DAS terhadap kualitas air sungai dan sedimentasi telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Namun permasalahan kualitas air dan sedimentasi bersifat lokal dan tidak seragam diseluruh dunia karena tergantung pada kombinasi dari beberapa faktor yaitu hidrometeorologi, geomorfologi, topografi lahan, variabel vegetasi dan aktivitas manusia (Suripin, 1998).

Tata guna lahan pada DAS beberapa sungai besar di Provinsi Bengkulu di dominasi

oleh hutan dan perkebunan. Selama rentang waktu lima tahun (1992-2007) luas hutan berkurang hampir 65%, sebaliknya luas lahan perkebunan dan pertanian bertambah hingga 50% (Bengkulu dalam angka, 2007).

Pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu pada beberapa sungai besar di Provinsi Bengkulu menunjukkan terjadinya penurunan kualitas air dari tahun ketahun. Beberapa parameter kimia seperti COD dan BOD mengalami penurunan, sedangkan TDS mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan konsentrasi TDS akan menyebabkan beberapa dampak negatif terhadap ekosistem dan peningkatan *bahan pencabut rambat* air baku menjadi air bersih pada perusahaan PDAM Bengkulu. Oleh karena itu penelitian ini mencoba untuk menganalisis hubungan antara pola perubahan penggunaan lahan dengan peningkatan kandungan TDS di beberapa sungai besar di provinsi Bengkulu.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan hubungan peningkatan konsentrasi TDS di beberapa sungai besar di Provinsi Bengkulu dengan perubahan pola tata guna lahan.

2. DASAR TEORI

2.1. Definisi Daerah Aliran Sungai

Berbagai definisi tentang Daerah Aliran Sungai (DAS) dikemukakan oleh beberapa peneliti. Mulyanto (1997) mendefinisikan DAS sebagai suatu kawasan yang mengalirkan air ke satu sungai utama.

Mennan (1980) mendefenisikan DAS adalah suatu wilayah penerima air hujan yang dibatasi

oleh punggung bukit atau gunung, dimana semua curah hujan yang jatuh diatasnya akan mengalir di sungai utama dan akhirnya bermuara ke laut.

Menurut kamus *Dictionary of scientific and technical term* (lapedes et.al., 1974) mendefenisikan DAS (watershed) sebagai suatu kawasan yang mengalirkan air ke satu sungai utama.

DAS menurut pasal 1 Undang-undang No. 07 tahun 2004 tentang sumber daya air adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Dengan demikian DAS (*watershed*) dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah daratan yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan dan mengalirkannya ke suatu titik, aliran tersebut meliputi aliran permukaan (*surface water flow*) dan aliran bawah tanah (*the underground movement of water*), batasannya ditentukan oleh suatu titik geografis yang spesifik pada wilayah tersebut, apabila titik-titik tersebut digambarkan dan dihubungkan satu sama lain maka garis tersebutlah yang merupakan batas suatu DAS (*Watershed Divide*), atau sebagai pemisah topografis suatu DAS, biasanya merupakan punggung bukit.



Gambar 1. Wilayah Daerah Aliran Sungai

2.2. Hubungan Tata Guna Lahan dan Kualitas Air Sungai

Pengelompokan tata guna lahan menurut Peta Topografi ada dua versi yaitu TNI-AD dan versi Bakosurtanal. Menurut versi TNI-AD lahan dapat dikelompokan menjadi lahan hutan, lahan basah, lahan kering, perairan dan lahan terbangun. Sedangkan menurut Bakosurtanal penggunaan lahan dikelompokan menjadi lahan hutan, sawah, perkebunan, semak belukar, tanah kosong, tegalan, perairan, rawa, bangunan dan pemukiman.

Hubungan penggunaan lahan (lahan hutan, lahan basah, lahan kering, dan lahan terbangun) dan pencemaran sungai yang terjadi dilihat dengan menggunakan regresi OLS (*ordinary least square*). Metode OLS adalah metode regresi yang berusaha meminimalkan jumlah deviasi kuadrat dari error. Deviasi dari error adalah selisih antara nilai estimasi variable terikat dengan nilai variable terikat sesungguhnya.

Bentuk persamaan matematisnya adalah sebagai berikut (Wahyuning Sih, E. 2005) :

$$y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_4 X_4 + \varepsilon(1)$$

Dimana :

Y = Variabel Akibat (*Independent Variable*)

X₁, X₂, ..., X_k = Variabel Penyebab (*Dependent Variable*)

β_i = Koefisien numerik.

Variable penyebab (X) dituliskan sebagai fungsi dari variable terikat (k), X_1, x_2, \dots, X_k . Random error ditambahkan untuk membuat model probabilistik. Nilai dari koefisien β_1 , menaksir kontribusi dari variable independent X_i , jika variabel independent ($k-1$) lainnya dijaga konstan, dan β_0 adalah perpotongan sumbu y. koefisien $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ biasanya tidak diketahui, karena koefisien – koefisien tersebut merepresentasikan parameter populasi.

2.3. Model Perilaku Erosi DAS

Pada sebuah DAS, laju erosi tahunan pada umumnya dimodelkan secara empirik dengan Universal Soil Loss Equation (USLE). Akan tetapi USLE hanya menyatakan laju erosi tahunan (E) yaitu massa sedimen yang tererosi dari sumbernya. Sedimen yang tererosi akan terpindahkan oleh aliran air melalui lereng DAS dan menuju sistem saluran. Sebagian massa sedimen akan terdepositasi (terendapkan) baik pada lereng DAS maupun sistem saluran, sehingga sedimen yang terekspor keluar dari sebuah DAS (Y) biasanya akan jauh lebih kecil dari massa sedimen yang tererosi. Perbandingan antara massa sedimen yang terekspor keluar dari suatu DAS (Y) dengan total massa sedimen yang tererosi (E) disebut sebagai sediment delivery ratio (SDR), sehingga SDR dapat dinyatakan secara

matematis (Poerbandono et al., 2006; Suripin, 1998);

$$SDR = \frac{Y}{E} \dots \dots \dots (3)$$

Estimasi SDR dihubungkan secara empiris dengan luas DAS sebagai berikut:

$$SDR = \alpha A^\beta \dots \dots \dots (4)$$

dengan A = luas DAS serta α dan β sebagai konstanta-konstanta empirik yang dapat diperoleh dari persamaan regresi. Nilai α dan β bervariasi tergantung pada kondisi suatu DAS.

Hubungan SDR dengan luas suatu DAS merupakan hubungan non linier dan merupakan persamaan berpangkat. Secara grafis hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Beberapa peneliti telah mencoba untuk menentukan hubungan antara SDR dengan Luas DAS, persamaan matematis yang diperoleh untuk berbagai wilayah dengan kondisi yang berbeda-beda adalah :

i) $SDR = -0.02 + 0.85 A^{-0.2}$ (Auerswald, 1992) (5)

$$\text{ii). } SDR = 0.42 \times \text{Area}^{-0.125} \quad (\text{Vanoni, 1975}) \quad (6)$$

$$\text{iii). } SDR = 0.417762 \times \text{Area}^{-0.134958} - 0.127097 \\ (\text{USDA-NRCS, 1983}) \quad (7)$$

Persamaan matematis yang menyatakan hubungan antara SDR dengan luas DAS tidak pernah sama antara suatu DAS dengan DAS yang lain. Hal ini disebabkan oleh faktor yang spesifik dan bersifat lokal dari suatu wilayah DAS tersebut. faktor tersebut seperti curah hujan, kemiringan lereng dan aktivitas manusia.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai dinas dan instansi terkait.

3.1.1. Data sekunder yang dibutuhkan adalah :

- Luas wilayah hutan dari tahun 1992-2007
 - Hasil pemantauan kualitas air dari tahun 1992 - 2007
 - Peta tata guna tanah dan lahan dari tahun 1992 – 2007

3.1.2. Data Primer yaitu hasil pengukuran konsentrasi TDS pada beberapa sungai besar di Provinsi Bengkulu.

3.2. Metoda pengambilan dan pengolahan sampel air.

Metoda pengambilan data untuk air dilakukan dengan pengambilan sampel sesaat (*grab sampel*) di lapangan dan analisis sampling dilakukan di laboratorium. Pengambilan volume sampel langsung dari badan air yang akan diteliti.

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan botol terbuat dari plastik dengan alat otomatis (*grab water sampler*) tipe Casella". Volume air yang diambil untuk pemeriksaan sifat fisik dan kimia adalah sebanyak 2.000 ml untuk masing-masing lokasi.

3.3. Metoda pengelahan data

3.3.1. Pengelompokan Tata Guna Lahan

Pengelompokan lahan dilakukan berdasarkan jenis penutup lahan dengan pembagian kelompok sebagai berikut:

- Kelompok I. Lahan hutan yang terdiri dari hutan hujan tropis.
 - Kelompok II. Lahan basah yang terdiri dari sawah, perairan (danau, empang, dll), dan rawa.
 - Kelompok III. Lahan Kering yang terdiri dari perkebunan, ladang, tegalan, tanah kosong, dan semak belukar.
 - Kelompok IV. Lahan terbangun yang terdiri dari bangunan dan pemukiman.

Berdasarkan pengelompokan tersebut dilakukan analisis regresi linier berganda. Variabel penyebab atau bebas (*independent variabels*) adalah luas lahan hutan, basah, kering dan terbangun. Variabel akibat atau terikat (*dependent variabel*) adalah konsentrasi TDS. Untuk menentukan korelasi antara pola penggunaan lahan dengan peningkatan konsentrasi TDS maka dilakukan uji F secara bersama-sama. Dengan hipotesis sebagai berikut : Jika $p\text{-value} < 0,01$; maka tolak H_0 , artinya perubahan luas tata guna lahan (hutan, lahan basah, lahan kering dan lahan terbangun) signifikan berpengaruh terhadap perubahan konsentrasi zat padat tersuspensi. Jika tidak maka yang berlaku sebaliknya.

Untuk menentukan pola perubahan pengunaan lahan yang paling mempengaruhi peningkatan konsentrasi TDS maka dilakukan Uji t secara parsial. Hipotesis yang digunakan adalah : Jika $Sig\ T < \alpha$, maka tolak H_0 sedangkan jika $Sig\ T \geq \alpha$, maka H_0 terima.

3.3.2. Linierisasi Fungsi yang Tidak Linier

Hubungan antara perubahan tata guna lahan dengan peningkatan konsentrasi polutan (TDS)

dinyatakan oleh persamaan berikut (Poerbandono et al, 2006; Suripin, 1998):

Jika SDR dinyatakan dengan y , Luas DAS dinyatakan dengan x , $\alpha = a$ dan $\beta = b$ maka persamaannya dapat dinyatakan dengan

Agar persamaan tersebut dapat diselesaikan dengan regresi linier maka dilakukan linierasi persamaan non linier.

Persamaan tersebut dapat dilinier-kan dengan menggunakan fungsi logaritmik sehingga didapat:

$$\log y = b \log x + \log a \dots \quad (9)$$

yang merupakan hubungan log-log antara $\log y$ dan $\log x$. Persamaan tersebut mempunyai bentuk garis lurus dengan kemiringan b dan memotong sumbu $\log y$ pada $\log a$. Penyelesaian persamaan tersebut dengan regresi linier dilakukan dengan transformasi log. Transformasi dengan menggunakan fungsi log, sehingga:

$$\log y = \log a x^b \rightarrow$$

Dilakukan transformasi berikut:

$$p = \log y \quad B = b$$

$$A = \log a \qquad q = \log x$$

Sehingga persamaan diatas dapat ditulis dalam bentuk:

$$\bar{\mathbf{p}} = A + B \bar{\mathbf{q}} \quad \dots \quad (11)$$

$$\bar{p} = \frac{\sum \log y_i}{n} \quad \dots \dots \dots \quad (13)$$

$$B = \frac{n \sum q_i p_i - \sum q_i \sum p_i}{n \sum q_i^2 - (\sum q_i)^2} \quad \dots \dots \dots \quad (14)$$

$$A = \bar{P} - B\bar{Q} \quad \dots \dots \dots \quad (15)$$

Diniana:

\bar{P} = Konentrasi TDS

$$q = \frac{\sum \log x_i}{n} = \text{Luas DAS}$$

A. B = Koeffizienten

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji model regresi berganda antara tata guna lahan (hutan, lahan basah, lahan kering dan lahan terbangun) dengan parameter TDS secara bersama-sama diperoleh hasil uji F hitung keluaran SPSS lebih besar dari nilai F tabel, artinya perubahan luas tata guna lahan (hutan, lahan basah, lahan kering dan lahan terbangun) signifikan berpengaruh terhadap perubahan konsentrasi TDS. Dengan melihat probabilitas (Sig) yang lebih kecil dari taraf signifikansi ($0,001 < 0,01$), dapat disimpulkan bahwa persamaan yang diajukan dapat diterima.

Untuk melihat perubahan tata guna lahan yang mana yang paling mempengaruhi perubahan konsentrasi TDS maka dilakukan Uji t secara parsial. Dari uji t secara parsial didapat gambaran bahwa perubahan tata guna lahan lahan yang paling signifikan berpengaruh terhadap perubahan konsentrasi TDS adalah konversi lahan hutan menjadi lahan kering. Penurunan satu satuan luas lahan hutan menjadi lahan kering akan mengakibatkan kenaikan satu satuan konsentrasi TDS, begitu sebaliknya penambahan satu satuan luas lahan hutan akan mengakibatkan terjadinya penurunan satu satuan konsentrasi TDS.


Hubungan antara konsentrasi TDS dengan luas DAS diperoleh dengan menyelesaikan persamaan regresi berpangkat dengan cara melakukan linierisasi persamaan berpangkat. Hasil perhitungan dengan regresi linier diperoleh persamaan transformasi antara hubungan konsentrasi TDS dengan luas hutan pada beberapa sungai besar di provinsi Bengkulu adalah :

$$TDS = 0.953 - 0.751 \text{ Luas DAS}$$

Dari persamaan transformasi tersebut ditentukan Persamaan non linier (berpangkat) antara konsentrasi TDS dengan luas DAS dan diperoleh persamaannya sebagai berikut:

$$TDS = 0.2750 + 0.1114 \text{ Luas DAS}^{-0.7513}$$

Dengan memasukan data luas DAS dan konsentrasi TDS kedalam persamaan diatas maka akan diperoleh grafik hubungan antara TDS dengan luas DAS sebagai berikut:



Gambar 2. Grafik Hubungan Luas DAS dengan Konsentrasi TDS

Dari grafik dan persamaan diatas didapat gambaran bahwa hubungan konsetrasi TDS pada beberapa sungai besar di provinsi Bengkulu berbanding terbalik dengan luas hutan yang ada pada DAS. Perubahan lahan dari hutan menjadi lahan kering akan

menyebabkan konsentrasi TDS meningkat sesuai dengan persamaan diatas.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hubungan antara konsentrasi TDS dengan luas DAS diperoleh persamaan berpangkat. Hasil perhitungan dengan regresi linier menghasilkan persamaan transformasi antara hubungan konsentrasi TDS dengan luas hutan pada beberapa sungai besar di provinsi Bengkulu adalah :

$$TDS = 0,953 - 0,751 \text{ Luas DAS}$$

Persamaan non linier (berpangkat) antara konsentrasi TDS dengan luas DAS diperoleh persamaannya

$$TDS = 0,2750 + 0,1114 \text{ Luas DAS}^{0,7513}$$

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Asdak, Chay. (1995). Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- [2]. Asdak, S. (1989). Konservasi Tanah dan Air. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- [3]. Auerswald, K. (1992). *Predicted and Measured Sediment Loads of Large Watersheds in Bavaria. 5th international Symposium on River Sedimentation*, Karlsruhe.
- [4]. Badan Pusat Statistik. (2007). Bengkulu Dalam Angka 2007, Bengkulu.
- [5]. Bapedalda Provinsi Bengkulu. (2007). Pemantauan Kualitas Air Sungai, Bengkulu.
- [6]. Bertine, K.K. dan Goldberg, E.D. (1971). *Fossil Fuel Combustion and the Major Sedimentary Cycle*. Science 173:233.
- [7]. Direktorat sungai, Ditjen Pengairan, (1990). Program Pembinaan Daerah Pantai. Jakarta
- [8]. Fardiaz, S. (1992). Polusi Air dan Udara, ISBN 979-413-770-7, Kanisius, Yogyakarta.
- [9]. Manan, S. (1977). Pengaruh Hutan dan Manajemen DAS. Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.
- [10]. Mulyanto, H. R. (2007). Fungsi Sungai dan Sifat-sifatnya. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- [11]. Mun, RE (ed). (1978). *Environmental Impact Assessment, Principles and Procedure*. United Nation Environmental Program (UNEP), Environmental Canada and Unesco, Toronto Canada.
- [12]. Poerbandono, dkk (2006). Evaluasi Perubahan Perilaku Erosi Daerah Aliran Sungai Citarum Hulu dengan Pemodelan Spasial, Jurnal Infrastruktur dan Lingkungan Binaan, Bandung.
- [13]. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Lingkungan Hidup DKI. Jakarta. (1988). Keputusan Gubernur Kepala Daerah DKI Jakarta Tentang Baku Mutu Air Sungai dan Air Limbah Industri.
- [14]. Sekretariat Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (2001). Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan

- Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Jakarta.
- [15]. Sekretariat Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup. (1988). Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor Kep-02/MENKLH/I/1988 tentang Baku Mutu Air.
- [16]. Suripin.(1998). *The effect of Land Use alteration and Soil Conservation Measures on Sediment Yield with Reference to Reservoirs in Tropical Areas*, Ph.D. Dissertation University of Innsbruck, Austria.
- [17]. U.S. Army Corps of Engineers. (1998), *HEC-6 Scour and Deposition in Rivers and Reservoirs User's Manual, Version 4.1*. Hydrologic Engineering Center, Davis, California.
- [18]. USDA-NRCS. (1983). *Sediment sources, yields, and delivery ratios. National Engineering Handbook, Section 3. Sedimentation*. U.S. Gov. Print. Office, Washington, DC.
- [19]. Vanoni, V.A. (1975). *Sedimentation engineering 54. ASCE manuals and reports on engineering practices*. ASCE, Reston, VA.
- [20]. Wahyuningsih. E. (2005). Pengaruh Perubahan Tata Guna Lahan Daerah Aliran Sungai Ciliwung Terhadap Kualitas Air Sungai Ciliwung, Tesis Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- [21]. Wischmeier, W. H., and Smith D.D. (1978). *Predicting Rainfall Erosion Losses- A Guide to Conservation Planning*. USDA Agriculture Handbook No. 537. USA.